

## Mesure de retombées de poussières sédimentables

Société **DOMITIA GRANULATS**

Carrière de  
**MONTREDON-DES-CORBIÈRES**

Juin 2018

# Rapport annuel 2017




*Juin 2018*

Responsable

Fabien BOUTONNET

Collaboration

Fabrice MOUTTET - Fabrice PERRARD - Vincent COEFFIC  
Christophe MULLOT - Julien MOUNICOU

	<b>Rédaction</b>	<b>Vérification</b>	<b>Approbation</b>
<b>Nom</b>	Vincent COEFFIC	Fabien BOUTONNET	Fabien BOUTONNET
<b>Qualité</b>	Laborantin	Directeur Délégué	Directeur Délégué
<b>Visa</b>			

## 1/ PRESENTATION GENERALE

La société Domitia Granulats a confié à Atmo Occitanie (issu de la fusion le 31 décembre 2016 d'AIR LR et de son homologue en Midi-Pyrénées ORAMIP) la surveillance des retombées de poussières sédimentables<sup>1</sup> dans l'environnement de la carrière de Montredon-les-Corbières.

- 3 février 2006 : mise en place d'un réseau permanent de mesure des retombées de poussières avec 4 points de mesure,
- octobre 2009 : ajout de la plaquette 5 au Nord de la plaquette 2 et de la D 613 afin de qualifier l'impact du trafic routier (ré envol de poussières) sur l'empoussièrment de la plaquette 2.
- octobre 2010 : en accord avec l'exploitant, la plaquette 2 a été supprimée.

Le descriptif des points de mesure est fourni en ANNEXE 2, le plan de l'implantation est en ANNEXE 3.

Le protocole de mesure des poussières sédimentables mis en œuvre par Atmo Occitanie se réfère à la norme AFNOR NF X 43-007 de décembre 2008 qui remplace celle de décembre 1973 (voir ANNEXE 1).

Ce protocole concerne exclusivement les **poussières sédimentables**. Il ne rend pas compte des éventuels problèmes liés aux poussières en suspension, beaucoup plus fines (diamètre moyen inférieur à 10 microns), dont la mesure et les effets sont complètement différents<sup>2</sup>.

Le présent rapport est arrêté à la date du 4 janvier 2018 et couvre l'ensemble de l'année 2017.

## 2/ NIVEAUX DE REFERENCE

En l'absence de seuil réglementaire, Atmo Occitanie, s'appuyant sur son expérience, a établi des ordres de grandeur qualifiant l'empoussièrment de la région.

### • Empoussièrment annuel

Moyenne annuelle du réseau	Qualificatif
< 150 mg/m <sup>2</sup> /jour	Empoussièrment faible
150 à 250 mg/m <sup>2</sup> /jour	Empoussièrment moyen
> 250 mg/m <sup>2</sup> /jour	Empoussièrment fort

Les niveaux de fond, observés sur la région, se situent entre 30 et 120 mg/m<sup>2</sup>/jour selon l'environnement du site étudié (garrigue, culture, ville ...).

### • Empoussièrment mensuel

Empoussièrment ponctuel	Qualificatif
> 350 mg/m <sup>2</sup> /jour > 1000 mg/m <sup>2</sup> /jour	Gêne potentielle importante Exceptionnel, il se rencontre dans l'environnement immédiat de certaines carrières ou de certains centres industriels particulièrement empoussiérés, généralement au cours de mois secs et / ou ventés.

La norme allemande fixe à 350 mg/m<sup>2</sup>/jour le seuil des nuisances importantes.

<sup>1</sup> On appelle **poussières sédimentables** (PSED), les poussières, d'origine naturelle (volcans...) ou anthropique (carrière, cimenteries...), émises dans l'atmosphère essentiellement par des actions mécaniques et qui tombent sous l'effet de leur poids.


<sup>2</sup> Les mesures de poussières en suspension réalisées en parallèle avec des mesures de poussières sédimentables n'ont pas permis de trouver quelque relation que ce soit entre les deux types de pollution. Ce résultat était attendu compte tenu de la différence d'origine, de composition chimique et de comportement observée entre les poussières sédimentables et les poussières en suspension.

### 3/ EMPOUSSIEREMENT DE FOND SUR LA REGION

L'empoussièrement de fond est déterminé à partir des plaquettes de référence constituant les réseaux de mesures de poussières sédimentables (voir paragraphe « Description d'un réseau de mesure des PSED » de l'ANNEXE 1).



Rappel : une plaquette de référence est placée en dehors de toute influence de l'activité polluante surveillée ; elle est représentative de l'environnement dans lequel se trouve le réseau de surveillance.

#### 3.1/ EMPOUSSIEREMENT DE FOND MOYEN REGIONAL



En 2017, l'empoussièrement de fond moyen sur la région est légèrement plus élevé que les 4 années précédentes. Il est néanmoins plus faible que celui enregistré en 2012.

#### 3.2/ EVOLUTION MENSUELLE DE L'EMPOUSSIEREMENT DE FOND MOYEN REGIONAL




En 2017, l'évolution mensuelle de l'empoussièrement de fond moyen se distingue sensiblement du profil « classique<sup>3</sup> » :

- la 1<sup>ère</sup> partie de l'année affiche des niveaux de d'empoussièrement plus faibles que ceux habituellement constatés,
- inversement, les valeurs constatées la 2<sup>nde</sup> partie de l'année sont généralement plus élevées,
- si le mois de juillet 2017 affiche logiquement l'empoussièrement mensuel le plus élevé de l'année, la valeur relevée en novembre est significativement plus élevée (66 mg/m<sup>2</sup>/jour) que la valeur habituellement constatée (43 mg/m<sup>2</sup>/jour).

#### 3.3/ EMPOUSSIEREMENT DE FOND URBAIN (1 site à Montpellier)

En 2017, l'empoussièrement de fond urbain mesuré à Montpellier s'élève à 55 mg/m<sup>2</sup>/jour.

Il est en légère diminution par rapport à 2016 malgré une pluviométrie en baisse; il reste toutefois plus élevé qu'en 2014 et 2015.



<sup>3</sup> Augmentation des niveaux en période estivale et valeurs plus faibles en période hivernale.

## 4/ CONDITIONS GENERALES SUR LA ZONE ETUDIEE

### 4.1/ EVOLUTION DU SITE EN 2017 (source : Domitia Granulats).

En 2017, l'exploitant n'a pas transmis d'information sur l'activité de la carrière.

### 4.2/ CONDITIONS METEOROLOGIQUES EN 2017

L'étude météorologique a été réalisée à partir des données de la station Météo-France de Narbonne.

#### ◆ Précipitations :

En 2017, le cumul des précipitations (305 mm) est inférieur (-44%) à celui de 2015 (542 mm), ainsi qu'à la normale de la station (702 mm). Le cumul de précipitations 2017 est le plus faible depuis le début des mesures.

La répartition des précipitations est très contrastée sur l'année 2017 :

- les mois de janvier (79 mm) et mars (77 mm) concentrent 49% des précipitations annuelles ;
- à l'inverse, août (1 mm), octobre (2 mm) et novembre (2 mm) ont été particulièrement secs.

#### ◆ Vents :

Les vents dominants (voir ANNEXE 6) sur le site sont les suivants :

- la Tramontane, de secteur Ouest,
- le Marin, beaucoup plus faible, de secteur Sud-Est.

## 5/ RESULTATS 2017 DES MESURES DE POUSSIÈRES SEDIMENTABLES

Le ramassage et les analyses des plaquettes ont été effectués par Atmo Occitanie.

Les résultats détaillés sont fournis en ANNEXE 4.

Un historique des résultats depuis 2006 est disponible en ANNEXE 5.

### 5.1/ MOYENNE GENERALE

**La moyenne générale du réseau s'établit, pour 2017, à 87 mg/m<sup>2</sup>/jour (empoussièrément faible), équivalente à celle de 2016 (92 mg/m<sup>2</sup>/jour), malgré la forte diminution de la pluviométrie qui aurait pu contribuer à la hausse des niveaux d'empoussièrément.**

Les empoussièrément mensuels les plus faibles ont été enregistrés au 1<sup>er</sup> trimestre, période présentant les précipitations les plus élevées de l'année. Inversement, les niveaux d'empoussièrément les plus importants ont été constatés lors des mois secs (juin, juillet, novembre).

### 5.2/ DETAILS PAR PLAQUETTE

**La plaquette 1** sert de référence au réseau. Elle affiche un empoussièrément faible (42 mg/m<sup>2</sup>/jour), légèrement inférieur à celui de 2016 (46 mg/m<sup>2</sup>/jour) ainsi qu'à l'empoussièrément régional moyen de fond de l'année 2017 (47 mg/m<sup>2</sup>/jour).

#### • **Est de la carrière sous la Tramontane (plaquettes 5 et 3)**

**La plaquette 5**, est située à 200 mètres à l'Est de l'entrée de la carrière (donc sous la Tramontane).

Elle affiche un empoussièrément faible (81 mg/m<sup>2</sup>/jour), légèrement supérieur à celui de 2016 (65 mg/m<sup>2</sup>/jour) ainsi qu'à l'empoussièrément de fond local (42 mg/m<sup>2</sup>/jour).

La plaquette 5 montre que l'activité de la carrière pourrait avoir une faible influence sur l'empoussièrément de son environnement immédiat sous la Tramontane.

**La plaquette 3** enregistre un empoussièrément faible (149 mg/m<sup>2</sup>/jour), inférieur à celui de 2016 (179 mg/m<sup>2</sup>/jour) mais supérieur à l'empoussièrément de fond local (42 mg/m<sup>2</sup>/jour).

Située à proximité de la route départementale 613, dans le prolongement de la plaquette 5, la plaquette 3 présente un empoussièrément supérieur à cette dernière, pourtant plus proche de la carrière.

Comme les années précédentes, la plaquette 3 apparaît donc influencée par la remise en suspension des poussières lors du passage de véhicules sur la départementale, notamment par temps sec.

- ***Nord-Ouest de la carrière sous le Marin (plaquette 4)***

**La plaquette 4** enregistre un empoussièrément faible (82 mg/m<sup>2</sup>/jour), supérieur à celui de 2016 (72 mg/m<sup>2</sup>/jour) et au niveau de fond local (42 mg/m<sup>2</sup>/jour).

Située au Nord-Ouest de la carrière (donc sous le Marin), cette plaquette pourrait subir une très faible influence de l'activité de la carrière.

### **5.3/ CONCLUSIONS**

***En 2017, les niveaux d'empoussièrément autour de la carrière de Montredon des Corbières sont faibles.***

***Entre 2016 et 2017, il n'a pas été constaté de hausse importante des niveaux d'empoussièrément autour de la carrière malgré la forte diminution de la pluviométrie qui aurait pu favoriser les envols de poussières***

***L'influence de l'activité de la carrière de Montredon-des-Corbières sur l'empoussièrément de son environnement immédiat est faible.***

***D'une manière générale, l'empoussièrément de la zone peut aussi être influencé par :***

- ***la carrière « Mont-Grand » exploitée par la société SC 113 et située à proximité,***
- ***le trafic routier sur la route D 613 (ré envol des poussières lors du passage des véhicules).***

#### 5.4/ CHANGEMENT DE LA METHODE DE MESURES

En application de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2016, le dispositif de surveillance des retombées de poussières sédimentables autour de la carrière de Montredon basé sur la mesure par plaquette de dépôts va évoluer en 2018 vers des mesures par jauges.

##### **Plaquette de dépôts Norme NFX 43-007**

*mesures mensuelles permanentes  
⇒ 12 campagnes de mesures par an*



##### **Jauge**

##### **Norme NFX 43-014**

*1 mesure de 30 jours tous les trimestres  
⇒ 4 campagnes de mesures par an*



Les plaquettes qui étaient jusqu'à présent utilisées pour la mesure des poussières sédimentables sont remplacées par des jauges de 10 L maintenues par un trépied.

---

#### **LISTE DES ANNEXES**

ANNEXE 1 : Protocole de mesures des poussières sédimentables (PSED)

ANNEXE 2 : Descriptif des points de mesure

ANNEXE 3 : Plan d'implantation du réseau

ANNEXE 4 : Résultats 2017

ANNEXE 5 : Historique des résultats depuis 2006

ANNEXE 6 : Rose des vents

ANNEXE 7 : Caractéristiques météorologiques de l'année 2017 en Languedoc-Roussillon

## ANNEXE 1

### Protocole de mesures des poussières sédimentables (PSED)

---

Le protocole de mesure des poussières sédimentables mis en œuvre par Atmo Occitanie s'appuie sur la norme AFNOR NF X 43-007 de décembre 2008 (*détermination de la masse des retombées atmosphériques sèches – Prélèvement sur plaquettes de dépôts – Préparation et traitement*) qui remplace celle de décembre 1973 (*mesure de retombées par la méthode des plaquettes de dépôt*).

Ce protocole est intégré à la démarche qualité d'Atmo Occitanie (certification ISO 9001 version 2008).

#### A/ Description d'un réseau de mesure des PSED

L'implantation d'un réseau nécessite d'identifier un certain nombre de sites types, à savoir :

- un site de référence, en dehors de toute influence de l'activité polluante surveillée et représentatif de l'environnement dans lequel se trouve le réseau de surveillance ;
- un ou plusieurs sites situés sous les principaux vents dominants ;
- un ou plusieurs sites dans l'environnement des principaux récepteurs (villages, vignes, ...).

Tous les sites de mesures doivent se trouver, sauf cas particuliers, à l'extérieur de la zone d'exploitation. Cette zone est identifiée comme la source. Réaliser des mesures dans cette zone revient à réaliser des mesures à l'émission.

#### B/ Appareillage utilisé



Les poussières sédimentables se déposent sur une plaquette métallique de surface connue (50 cm<sup>2</sup>), enduite d'un fixateur et installée horizontalement à 1,5 m de haut (voir photo ci-contre)

Les mesures se font dans un environnement dégagé, permettant la libre circulation des poussières autour du dispositif.

#### C/ Temps d'exposition

La durée d'exposition des plaquettes a été fixée à un mois. Les plaquettes sont ensuite analysées en laboratoire.

#### D/ Analyse au laboratoire



Les analyses réalisées par AIR LR se déroulent en 3 temps :

- Lavage de la plaquette à l'aide d'un solvant afin de récupérer les poussières sur un filtre préalablement pesé,
- Passage du filtre chargé de poussières à l'étuve pour évaporer le solvant,
- Pesée du filtre chargé de poussières.

Les résultats sont exprimés en milligrammes de poussières déposées par mètre carré et par jour (**mg/m<sup>2</sup>/jour**).



## Site de Montredon

**CP1 (réf)** : Référence. De la RN113, prendre le chemin partant au Sud au lieu dit "Pech entre deux chemins" (en face entrée Montredon-des-Corbières). La plaquette est devant l'entrée de la propriété privée située au bout du chemin.

**CP3** : A environ 250 m à l'Est de la CP5. La plaquette est en contrebas de la route D613, à quelques dizaines de mètres.

**CP4** : Au Nord-Ouest de la carrière. L'accès à cette plaquette se fait par la carrière.

**CP5** : Sous le vent de la carrière, à 250 m à l'Est de la carrière et au Nord de la route D613




Tableau de résultats de l'année 2017 - Montredon

PERIODE	CP1	CP3	CP4	CP5	MAX	MIN	MOY	PLUIE
05/01 - 03/02	35	61	32	37	61	32	41	79
03/02 - 02/03	24	RAT	16	29	29	16	23	58
02/03 - 04/04	18	73	22	40	73	18	38	77
04/04 - 03/05	44	219	203	68	219	44	134	13
03/05 - 01/06	50	139	63	96	139	50	87	18
01/06 - 04/07	65	64	289	151	289	64	142	9
04/07 - 31/07	52	300	56	123	300	52	133	6
31/07 - 01/09	21	131	75	102	131	21	82	1
01/09 - 04/10	27	155	38	61	155	27	70	19
04/10 - 03/11	64	133	55	59	133	55	78	2
03/11 - 04/12	88	297	96	171	297	88	163	2
04/12 - 04/01	14	66	35	39	66	14	38	21
<b>MAXIMUM</b>	88	300	289	171	300		163	
<b>MINIMUM</b>	14	61	16	29		14	23	Total
<b>MOYENNE</b>	42	149	82	81			87	305


Résultats exprimés en mg/m<sup>2</sup>/jour

Lorsque le résultat est <10 mg/m<sup>2</sup>/jour, la valeur retenue pour le calcul de la moyenne est 5 mg/m<sup>2</sup>/jour

D = Disparu MI = Mesure invalidée RAT = Retrouvé à terre AI = Accès impossible \* = Non pris en compte dans la moyenne

Pluie en mm d'eau mesurés sur la station Météo-France de Narbonne (normale 702mm)

Empoussièrément et précipitations : évolution mois par mois au cours de l'année 2017



## RÉSEAU POUSSIÈRES SÉDIMENTABLES DE MONTREDON

Tableau historique depuis 2006

ANNEE	CP1	CP3	CP4	CP5	MAX	MIN	MOY	PLUIE
2006	83	226	121		226	83	205	194
2007	87	208	88		208	87	168	475
2008	67	198	116		198	67	131	386
2009	40	150	98		150	40	147	503
2010	42	121	71	61	121	42	74	560
2011	48	87	77	57	87	48	67	721
2012	36	106	67	59	106	36	67	425
2013	40	71	57	52	71	40	55	559
2014	45	72	71	50	72	45	59	669
2015	32	69	47	55	69	32	51	350
2016	46	179	72	65	179	46	92	542
2017	42	149	82	81	149	42	87	305
<b>MAXIMUM</b>	87	226	121	81	226		205	
<b>MINIMUM</b>	32	69	47	50		32	51	Moy.
<b>MOYENNE</b>	51	136	81	60			100	474

Résultats exprimés en mg/m<sup>3</sup>/jour. Les plaquettes en italique ne sont plus utilisées.  
Pluie en mm d'eau mesurés sur la station Météo-France de Narbonne (normale 702 mm)


### Commentaires :

Année 2006 : Moyenne d'empoussièrement et pluviométrie associée calculées sur 11 mois (février à décembre). Pour information, le cumul des précipitations de l'année 2006 est de 451 mm.

Année 2009 : la plaquette 5 a été installée en octobre. Ses résultats ne sont pas pris en compte dans le calcul des différents moyennes.


Année 2010 : la plaquette 2 a été supprimée en octobre.

### Empoussièrement et précipitations : évolution annuelle depuis 2006





ROSE DES VENTS 2017 A NARBONNE



Source : Station Météo France de NARBONNE

Les éléments ci-dessous sont issus de la 1<sup>ère</sup> page des bulletins climatiques Languedoc-Roussillon disponibles gratuitement sur le site Internet de Météo France.

**Janvier 2017 : « De fortes pluies locales »**

- **Caractère dominant du mois** : Après une longue période plus chaude que la normale, le froid hivernal s'impose en janvier avec une situation pluviométrique toute en contraste.
- **Précipitations** : Les cumuls, le plus souvent excédentaires du fait d'un épisode très pluvieux, sont contrastés, déficitaires parfois (dans le Lauragais, l'est du Gard et l'ouest de la Lozère).
- **Températures** : Partout, il fait plus froid que la normale, dans la nuit tout comme en journée, particulièrement sur le relief.
- **Ensoleillement** : L'ensoleillement mensuel est très généreux en plaine languedocienne, dans une moindre mesure à Perpignan.

**Février 2017 : « Gris, très doux, parfois pluvieux »**

- **Caractère dominant du mois** : Après l'intermède frais de janvier, une douceur printanière prématurée s'impose mais le temps reste gris, bien sec dans la plaine languedocienne, plus arrosé ailleurs.
- **Précipitations** : Le temps est tantôt sec, comme du Biterrois à l'est du Gard, tantôt bien arrosé de la moitié est de l'Aude aux Cévennes en passant par les contreforts de l'Hérault.
- **Températures** : Il fait remarquablement doux pour la saison, particulièrement la nuit et à l'ouest de la région, ailleurs aussi mais dans une moindre mesure.
- **Ensoleillement** : L'ensoleillement mensuel est fortement déficitaire en plaine languedocienne, moins déficitaire à Perpignan.

**Mars 2017 : « Arrosé et bien doux »**

- **Caractère dominant du mois** : Mars est maussade et pluvieux en Languedoc, plus ensoleillé dans le Roussillon. La douceur est de mise tout comme ce fut le cas en février, particulièrement en journée.
- **Précipitations** : Les cumuls sont excédentaires partout, de manière plus marquée au sud de la Lozère, dans le Gard et dans les Pyrénées-Orientales.
- **Températures** : La douceur prédomine durant tout le mois, Mars 2017 se situant en seconde position parmi les mois de mars les plus doux depuis 1960.
- **Ensoleillement** : L'ensoleillement est globalement généreux en Catalogne tandis qu'il reste légèrement déficitaire dans la plaine languedocienne.

### Avril 2017 : « Sec et très ensoleillé »

- **Caractère dominant du mois** : La douceur se prolonge jusqu'au 18 puis il fait très frais durant la dernière décade. Les pluies sont rares et l'ensoleillement très généreux.
- **Précipitations** : Les cumuls mensuels sont le plus souvent déficitaires sauf sur les Cévennes gardoises où ils sont légèrement excédentaires.
- **Températures** : Les températures sont contrastées, bien douces pour la saison jusqu'au 18, plus fraîches ensuite avec des gelées de printemps du 19 au 22.
- **Ensoleillement** : L'ensoleillement mensuel est très largement excédentaire dans le Roussillon tout comme en plaine languedocienne

### Mai 2017 : « Sécheresse »

- **Caractère dominant du mois** : Le temps est sec presque partout, de manière plus marquée du Biterrois jusqu'au littoral de l'Aude. Une période de fraîcheur en début de mois précède une période de douceur relative.
- **Précipitations** : Globalement, la sécheresse est omniprésente mais dans une moindre mesure à l'ouest de l'Aude et du centre de l'Hérault au piémont cévenol où localement des orages ont donné quelques pluies.
- **Températures** : Les températures sont contrastées : après une première décade bien fraîche avec quelques gelées au sol tardives en Lozère, à compter du 14, il fait plutôt doux pour la saison.
- **Ensoleillement** : L'ensoleillement mensuel est généreux, encore plus à Montpellier qu'à Perpignan.

### Juin 2017 : « Très chaud, orages locaux »

- **Caractère dominant du mois** : Le temps est estival, très chaud, contrasté côté pluie, tantôt instable avec des orages parfois virulents comme en Cerdagne, tantôt bien sec.
- **Précipitations** : La sécheresse se prolonge du Biterrois à l'Aude mais du fait des orages, des secteurs sont bien arrosés comme à l'est de l'Hérault et dans les Pyrénées-Orientales.
- **Températures** : Juin est très chaud et figure parmi les plus chauds depuis une cinquantaine d'années (en seconde position) du fait d'un fort pic de chaleur survenu à mi-parcours.
- **Ensoleillement** : L'ensoleillement mensuel est légèrement excédentaire sur l'ensemble de la zone.

### Juillet 2017 : « Beau temps parfois orageux »

- **Caractère dominant du mois** : Juillet est partiellement sec (dans le Gard et la majeure partie de l'Hérault), plutôt ensoleillé avec des températures légèrement supérieures à la normale.
- **Précipitations** : Les cumuls mensuels sont contrastés du fait d'averses ponctuelles, parfois orageuses, notamment en Lozère, dans le Lauragais, les Cévennes et la partie occidentale du Roussillon.
- **Températures** : Après un mois de juin très chaud, il fait toujours relativement chaud mais l'ambiance est beaucoup moins torride notamment en moyenne montagne la nuit.

- **Ensoleillement** : L'ensoleillement mensuel est légèrement excédentaire sur l'ensemble de la zone, de manière plus marquée en plaine languedocienne.

#### **Août 2017 : « Sec et chaud »**

- **Caractère dominant du mois** : Après un mois de juillet chaud et parfois orageux, août globalement garde un aspect très estival de par sa chaleur et sa sécheresse.
- **Précipitations** : Il a très peu plu de l'est de l'Aude au Gard (dans une zone englobant l'Hérault) mais les cumuls sont excédentaires dans l'ouest des Pyrénées-Orientales et en Margeride.
- **Températures** : Août est bien chaud (en 4<sup>ème</sup> position parmi les mois d'août les plus chauds depuis 1960) dans la continuité d'un été déjà largement plus chaud que la normale dès début juin.
- **Ensoleillement** : L'ensoleillement mensuel est légèrement déficitaire dans la plaine languedocienne et le déficit est encore plus marqué en Catalogne.

#### **Septembre 2017 : « Plus frais mais bien sec »**

- **Caractère dominant du mois** : Les températures chutent après une longue période de chaleur estivale tandis qu'une sécheresse extrême s'installe de l'Aude au Gard.
- **Précipitations** : Le temps reste sec (sauf à l'extrémité ouest des Pyrénées-Orientales), de manière encore plus marquée de l'Hérault au Gard, dans une zone englobant les Cévennes et Causses.
- **Températures** : Voilà un intermède de fraîcheur après une longue période bien plus chaude que la normale et qui s'est installée dans la durée depuis le début de l'été.
- **Ensoleillement** : L'ensoleillement mensuel est proche de la normale, légèrement déficitaire à Perpignan et légèrement excédentaire à Montpellier.

#### **Octobre 2017 : « Globalement sec, des orages locaux »**

- **Caractère dominant du mois** : La sécheresse en plaine s'accroît au fil de ce semestre, de manière inquiétante pour les écosystèmes en stress hydrique. Toutefois, quelques orages éclatent dans les Causses.
- **Précipitations** : Les cumuls mensuels sont presque partout déficitaires sauf dans les Causses et la frange littorale du Roussillon. La sécheresse est marquée dans le Gard, le nord-Lozère et le Lauragais.
- **Températures** : Les températures diurnes dépassent largement la normale notamment en Lozère et dans le Gard tandis que les minimales sont plus contrastées quant à leur rapport à la normale.
- **Ensoleillement** : Le soleil est au rendez-vous. Octobre 2017 compte parmi les mois d'octobre les plus ensoleillés depuis 1960 (en seconde position à Montpellier et Perpignan).



### **Novembre 2017 : « Sec, ensoleillé et venté »**

- **Caractère dominant du mois** : Après un semestre bien sec, la sécheresse perdure globalement. Cers et tramontane sont fréquents, l'ensoleillement généreux et les températures légèrement inférieures à la normale.
- **Précipitations** : Le stress hydrique est encore bien fort. La sécheresse prolongée devient cruciale presque partout, particulièrement dans le Roussillon et la plaine languedocienne.
- **Températures** : Les températures sont globalement analogues à la normale mais les minimales lui sont le plus souvent inférieures, particulièrement dans le Gard, les Causses et le nord-Lozère.
- **Ensoleillement** : L'ensoleillement partout est très généreux par rapport à la normale.

### **Décembre 2017 : « Toujours sec en plaine »**

- **Caractère dominant du mois** : Le temps est relativement frais pour la saison, encore sec en basse altitude et dans les Pyrénées-Orientales, plus arrosé en Lozère et du pays de Sault au Lauragais.
- **Précipitations** : Après 7 mois déjà bien secs, la sécheresse perdure du Roussillon au Gard, épargnant le Lauragais, le pays de Sault et la Lozère où les cumuls mensuels sont excédentaires.
- **Températures** : Décembre est un peu frais pour la saison après un hiver 2016/2017 qui fut particulièrement doux. Les températures minimales sont particulièrement fraîches dans le centre du Gard.
- **Ensoleillement** : Il est déficitaire dans le Roussillon mais légèrement excédentaire dans la plaine languedocienne.